

# 复方玄驹胶囊治疗不孕不育临床疗效观察

崔海,伍燕青

(电白县妇幼保健院,广东 茂名 525400)

**摘要:**目的:分析复方玄驹胶囊的中药和西药成分,观察其治疗不孕不育的临床疗效。方法:选取140例不孕不育患者为研究对象,将其平均分为对照组和治疗组,对照组采用醋酸泼尼松龙治疗,治疗组采用复方玄驹胶囊治疗,对比两组的治疗效果及患者治疗前后的生殖激素指标变化情况。结果:所有患者经过治疗后症状均有所改善,治疗组总有效率为95.7%,对照组总有效率为88.6%,两组比较差异显著,具有统计学意义( $P < 0.05$ )。治疗组用药后生殖激素指标有明显改善,与治疗前比较差异显著( $P < 0.05$ )。结论:复方玄驹胶囊治疗不孕不育效果显著,安全性好,值得临床推广应用。

**关键词:**复方玄驹胶囊;前列腺症患者;肾阳虚;疗效

中图分类号:R256.56

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2014)06-0128-01

复方玄驹胶囊是国家中药保护品种之一,同时含有中药成分和西药成分,其组成药物有玄驹、淫羊藿、蛇床子和枸杞子等,具有补肾益精的功效。现代医学认为,不孕不育是由肾虚、精子少等造成的<sup>[1]</sup>。笔者为了进一步了解复方玄驹胶囊治疗不孕不育的疗效,现选取我院2012年3月—2013年8月收治的140例不孕不育患者为研究对象,其中70例患者采用复方玄驹胶囊治疗,与同期采用醋酸泼尼松龙治疗的70例患者进行疗效对比,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 临床资料

选取我院2012年3月—2013年8月收治的140例不孕不育患者为研究对象。140例患者均为男性,年龄23~44岁,平均年龄(27±3.4)岁,不育年限为1~7年。患者的临床症状为腰膝酸软或疼痛、性欲减退、面色微黄、小便频数或余沥不尽以及畏寒肢冷等。所有患者经临床诊断均符合《中药新药临床研究指导原则》的中医证候诊断标准,同时排除合并心脑血管、肝等造血系统疾病者。将所有患者随机均分为两组,每组70例,两组患者的年龄、临床表现等一般资料比较差异无统计学意义( $P > 0.05$ ),具有可比性。

### 1.2 治疗方法

治疗组患者口服复方玄驹胶囊治疗,3次/天,3粒/次,以30天为1个疗程,共服用3个疗程。对照组口服醋酸泼尼松龙治疗,2次/天,5mg/次。两组患者均同时接受生活指导,主要包括戒除烟酒等不良嗜好以及排卵期禁止同房等。治疗3个疗程后对两组患者的治疗效果进行对比分析,判断复方玄驹胶囊的治疗效果<sup>[2]</sup>。

### 1.3 疗效标准

参照《不孕不育治疗学》、《计划生育技术》拟定疗效标

准。①显效:治疗后精子密度 $> 20 \times 10^9/L$ ,或配偶受孕;②有效:治疗后精子密度增加 $10 \times 10^9/L$ 以上,临床症状改善;③无效:治疗后精子密度未见变化或变化甚微。

### 1.4 统计学分析

采用SPSS12.0软件对本实验数据进行统计学分析,其中计量资料比较采用 $t$ 检验,计数资料比较采用卡方检验,以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 两组患者治疗效果比较

治疗组70例患者中,显效39例,有效28例,无效3例,总有效率为95.7%;对照组70例患者中,显效20例,有效42例,无效8例,总有效率为88.6%。两组的总有效率比较差异显著,具有统计学意义( $P < 0.05$ ),如表1所示。

表1 两组临床疗效比较 [n(%)]

组别	例数(n)	显效	有效	无效	总有效率(%)
治疗组	70	39(55.7)	28(40)	3(4.3)	95.7
对照组	70	20(28.6)	42(60)	8(11.4)	88.6

### 2.2 治疗组用药前后精液生化分析指标变化情况

采用复方玄驹胶囊治疗后,治疗组患者精液的果糖含量与治疗前比较差异无统计学意义( $P > 0.05$ ); $\alpha$ -中性糖苷酶含量与用药前比较差异有统计学意义( $P < 0.05$ ),如表2所示。

表2 治疗组用药前后精液生化分析指标变化 ( $\bar{x} \pm s$ )

项目	用药前	用药后	
		4周	12周
果糖含量 ( $\mu\text{mol/mL}$ )	18.02±12.14	16.29±5.34	20.24±10.12
$\alpha$ -中性糖苷酶 (U/mL)	35.53±14.21	39.12±14.35	43.21±18.53

收稿日期:2013-10-22

作者简介:崔海(1977—),男,广东省茂名市电白县妇幼保健院主管药师,研究方向为医院制剂。

# 兰索拉唑和奥美拉唑为基础的三联疗法 根治幽门螺杆菌临床疗效观察

李苑红

(深圳市石岩人民医院,广东 深圳 518000)

**摘要:**目的:探讨采用以兰索拉唑和奥美拉唑为基础的三联疗法根治幽门螺杆菌的临床疗效。方法:随机选择66例诊断为幽门螺杆菌感染的患者为研究对象,采用随机分组法,其中奥美拉唑组33例,治疗药物为奥美拉唑、克拉霉素、阿莫西林三种药物联合;兰索拉唑组33例,治疗药物为兰索拉唑、克拉霉素、阿莫西林三种药物联合,对比两组患者的腹痛消失时间、有效率、幽门螺杆菌阴性率及复发率。结果:兰索拉唑组患者腹痛消失时间明显较奥美拉唑组短,第1、4、7、28天腹痛消失率也存在显著差异,具有统计学意义( $P < 0.05$ );以兰索拉唑为基础的三联疗法对幽门螺杆菌抑制作用强,治愈率高,复发率低,优于以奥美拉唑为基础的三联疗法。结论:以兰索拉唑为基础的三联疗法在治疗幽门螺杆菌感染方面有明显疗效,对幽门螺杆菌有较强的抑制作用,显效快且复发少,优于奥美拉唑三联疗法,值得临床推广应用。

**关键词:**奥美拉唑;兰索拉唑;幽门螺杆菌;三联疗法

中图分类号:R578.1

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2014)06-0129-02

幽门螺杆菌(Hp)为导致胃及十二指肠溃疡的主要致病菌。近年来,胃及十二指肠溃疡的发病率逐年上升,复发率高,不易治愈<sup>[1]</sup>。在该病的治疗中,不仅要及时治愈溃疡,更应防止溃疡复发。质子泵抑制剂作为常规用药,在抑制胃酸方面效果显著。单独采用质子泵抑制剂治疗复发率高,病痛的反复折磨严重影响患者的生活质量<sup>[2]</sup>。本次研究比较在奥美拉唑或兰索拉唑的基础上联合阿莫西林、克拉霉素的两种三联疗法的临床疗效,现报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选择2012—2013年本社区内被明确诊断为Hp感染的

66例患者为研究对象,采用随机分组法,其中奥美拉唑组33例,男20例,女13例,年龄为25~59岁,平均年龄为(44.3±4.23)岁,采用以奥美拉唑为基础的三联疗法治疗;兰索拉唑组33例,其中男21例,女12例,年龄26~58岁,平均年龄为(43.8±4.9)岁,采用以兰索拉唑为基础的三联疗法治疗。两组患者的性别、疾病、年龄等一般资料比较差异无统计学意义( $P < 0.05$ ),具有可比性。

### 1.2 方法

奥美拉唑组采用的药物为奥美拉唑(四川科伦药业股份有限公司,H20120401),口服,40mg/天,1天2次;兰索拉

等,值得临床推广应用。

## 参考文献:

- [1] 刘永杰,黄宇烽,邵永,等.复方玄驹胶囊改善精液质量的临床观察[J].中华男科学杂志,2007(4):364-365.
- [2] 蔡健,邓哲献,蒋海波.复方玄驹胶囊治疗勃起功能障碍的疗效观察[J].中华男科学杂志,2006,12(6):568-569.
- [3] 杨毅,何文桂,吴德锋,等.复方玄驹胶囊治疗少弱精子症79例[J].浙江中医杂志,2010,45(5):345.
- [4] 金灿,毛金观.复方玄驹胶囊治疗少弱精子症33例临床效果评价[J].海峡药学,2009,21(3):118-119.

(责任编辑:尹晨茹)

## 3 讨论

随着医疗技术的不断发展,治疗勃起功能障碍症的方法越来越多,如药物治疗、传统的针灸治疗法、行为治疗以及心理疗法,这些治疗方法都有一定的效果。中医和西医都有各自的优势,但只采取其中一种治疗方案效果不甚明显,医生通常会采取中西医结合的治疗方法。复方玄驹胶囊治疗不孕不育效果满意<sup>[3]</sup>,常用于综合治疗。

复方玄驹胶囊由玄驹、淫羊藿、蛇床子和枸杞等中药配制而成,是国家中药保护品种之一。该药疗效稳定持久、安全、无毒副作用,标本兼治。玄驹含有50多种人体必需的营养物质,其中有30多种氨基酸,31种微量元素,锌、磷、铁的含量最多<sup>[4]</sup>。应用复方玄驹胶囊治疗治愈了很多男性不育患者,此外其还可以治疗女性月经不调、不孕、异常妊娠

收稿日期:2013-11-28

作者简介:李苑红(1975—),女,广东省深圳市石岩人民医院主治医师,研究方向为消化内科疾病。